Faunitaxys

Revue de Faunistique, Taxonomie et Systématique morphologique et moléculaire

Volume 14
Numéro 32

Avril 2026

ISSN (Print) : 2269 - 6016
ISSN (Online) : 2970 - 4960
Dépôt légal : Avril 2026

Faunitaxys

Revue de Faunistique, Taxonomie et Systématique morphologique et moléculaire

ZooBank : https://zoobank.org/79A36B2E-F645-4F9A-AE2B-ED32CE6771CC

Directeur de la publication, rédacteur, conception graphique et PAO:
Lionel Delaunay

Cette revue ne peut pas être vendue
Elle est distribuée par échange aux institutions (version papier)
et sur simple demande aux particuliers (format PDF)
à l'adresse suivante:

AFCFF (Association française de Cartographie de la Faune et de la Flore)
28, rue Voltaire, F- 42100 Saint Etienne
E-mail: faunitaxys.journal@gmail.com

Elle est disponible librement au téléchargement à partir du site:

https://faunitaxys.fr/

La parution de *Faunitaxys* est apériodique

Faunitaxys est indexé dans / ***Faunitaxys*** is indexed in:
- Zoological Record
Articles and nomenclatural novelties are referenced by:
- ZooBank (https://zoobank.org)
Online Archives:
- HAL (https://hal.archives-ouvertes.fr)
- Internet Archive (https://archive.org/details/faunitaxys)

Imprimée sur les presses de SPEED COPIE, 6, rue Tréfilerie, F- 42100 Saint-Etienne

Imprimé le 30 04 2026

https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(32)

Dos nuevas especies del género *Echinovelleda* Breuning, 1936 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). Longicornios nuevos de Vietnam (Pars 14)

EDUARD VIVES

Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Entomologia), Passeig Picasso s/n. E-08003, Barcelona, Spain.
- eduard_vives@hotmail.com - ZooBank : https://zoobank.org/8313D55B-D4A1-4E09-98DF-901E61DE562B - Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5980-7018

Palabras clave:

Coleoptera ;
Cerambycidae ;
Lamiini ;
Echinovelleda ;
bii ;
vietnamica ;
nueva especie ;
Vietnam.

Resumen. – Se describen dos nuevas especies del género *Echinovelleda* Breuning, 1936, *E. bii* **n**. **sp**. y *E. vietnamica* **n**. **sp**. procedentes del norte de Vietnam. Se comenta el traspaso del género *Echinovelleda* Breuning a la tribu Lamiini.

Vives E., 2026. – Dos nuevas especies del género *Echinovelleda* Breuning, 1936 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). Longicornios nuevos de Vietnam (Pars 14). *Faunitaxys*, 14(32) : 1 – 4.

DOI: https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(32)

ZooBank: https://zoobank.org/57580DC4-498A-48DF-9F95-58AD0FC4975C

Received: 08/04/2026 – *Revised*: 08/04/2026 – *Accepted*: 10/04/2026

Introducción

El género *Echinovelleda* fue descrito por Breuning (1936) para incorporar la nueva especie *E. chinensis* Breuning, 1936, tipo de dicho género, situándolo en la tribu Phrisomini de Lacordaire. Anteriormente Pic (1925) describió de Tonkin *Trachystola vitalisi*, actualmente situada en el género *Echinovelleda*. Recientemente Huang et al. (2020) describieron el género *Propedicellus* para situar las especies *P. vitalisi* (Pic) y dos nuevas especies *P. guoliangi* y *P. qiului*, incluyendo una clave dicotómica para separar hembras y machos del nuevo género. Posteriormente Bi & Chen (2021) describen dos nuevas especies de *Echinovelleda*, *E. yanzie* y *E. inermis*. En 2024 Bi, Mu & Lin, revisan el género *Echinovelleda*, al que sinonimizan *Propedicellus* y al mismo tiempo describen dos nuevas especies *E. protochinensis* y *E. mumuae*, procedentes de Yunnan.
Dicho autor (Bi, 2016) discute ampliamente la pertenencia de estos géneros y estas especies a la tribu Phrisomini por compartir muchos caracteres con la tribu Lamiini, como la presencia de una cicatriz escapular completa, metasterno acortado, cavidades mesocoxales abiertas, uñas divaricadas y muy especialmente la morfología del endofalo masculino muy similar a la de los representantes de la tribu Lamiini. Finalmente Löbl & Smetana (2010) y de Danilevsky (2025) con mucho acierto deciden traspasar estos géneros mencionados a la tribu Lamiini, criterio que también seguiremos en este trabajo. Con la descripción de las dos nuevas especies vietnamitas, el género *Echynovelleda* pasa a contener diez especies.

Taxonomía

Familia **Cerambycidae**

Subfamilia **Lamiinae**

Tribu **Lamiini**

***Echinovelleda bii* nov**. **sp**.

(Fig. 1-3)

ZooBank: https://zoobank.org/44B3CF1D-7488-45D8-8895-C9F4FAD810B3

Holotipo, ♂, de 26 mm de longitud y 6,5 mm de ancho en los hombros, procedente de Vietnam Norte, Moung Te, Lao Chau, 1.700 m, VI-2025, local collector (CEV).

Paratipos, **4** ♀, Vietnam N. Ha Giang, Vixuyen, 1-VI-2025, Calvin Chen leg, (CEV).

Coloración general (Fig. 1) de los tegumentos negros, con tomento dorado corto en la cabeza, parte inferior del escapo, formando bandas doradas en el pronoto y disperso en la base de los élitros, formando manchas dispersas hasta la mitad de los élitros. Con una gran mancha transversa de tomento negro en la mitad posterior elitral y con manchas de tomento pardo recubiertas en parte por tomento dorado. Estas manchas se extienden por los lados de los élitros y por las epipleuras. Parte inferior del cuerpo recubierta a trozos por tomento pardo y tomento dorado. Patas negras con tomento pardo en forma de manchas y con tomento dorado en el ápice de las tibias.

Cabeza en forma globosa, fuertemente punteada, surcada longitudinalmente. Ojos lobulados, con el lóbulo inferior tan largo como ancho, ojos microfacetados, mejillas abultadas y rugosas, con tomento dorado abatido. Cuello corto y ancho, muy incluido en el pronoto. Frente trapezoidal más ancha en su borde anterior, surcada longitudinalmente. Epístoma corto y translucido, labro punteado, sinuado en su borde anterior, con largas sedas doradas en ambos lados y un flequillo de cortas sedas doradas en el borde anterior. Mandíbulas cortas y anchas, con el borde interno levemente dentado, el externo ancho, triangular y con tomento dorado, con su ápice poco recurvado. Palpos labiales con el último artejo cónico y truncado en su parte apical. Parte inferior de la cabeza muy corta, lisa, brillante y surcada transversalmente. Antenas largas y finas en el macho, sobrepasando el ápice elitral en los machos a partir del 5º artejo, con el escapo cilíndrico y rugoso, provisto de un corto tomento dorado en su cara inferior. Pedicelo corto y ancho sin trazas de la expansión lateral que poseen otras especies de este género., 3º artejo largo y cilíndrico, levemente globoso en su parte distal, provisto de un corto tomento gris muy denso, el 4º artejo levemente más largo que el 3º, el resto de los artejos son más finos y levemente más largos.

Pronoto cilíndrico, levemente más largo que ancho (ratio:10x12), de lados levemente arqueados y provistos de una aguda espina en su mitad. Borde anterior finamente rebordeado, el posterior rebordeado y surcado transversalmente. Zona discal muy rugosa, con una protuberancia central posterior, unos leves pliegues transversos y dos protuberancias anteriores. Tomento dorado corto y abatido en el centro del disco y repartido muy irregularmente en el resto del pronoto. Escudete largo y de ápice redondeado, recubierto de un denso tomento dorado excepto en el ovalo central que es negro y brillante.

Reviewers :
Gérard Tavakilian (*Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, France*) - https://zoobank.org/607BDB90-7FE1-42A6-9329-8982CE39E658 - https://orcid.org/0000-0002-3310-1903
Jérôme Sudre *(Montpellier, France)* - https://zoobank.org/08184D6D-3B94-4C47-9706-7CCB7AC259AA

This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs License, which permits use and distribution in any medium, provided the original work is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.
Copyright 2025 The Authors. *Faunitaxys* published by Lionel Delaunay on behalf of the AFCFF (Association française de Cartographie de la Faune et de la Flore).

Élitros largos y estrechos, subparalelos (ratio:85x45), estrechándose a partir de su base hasta el ápice que es redondeado en cada élitro. Hombros salientes en ángulo recto, provistos de grandes tubérculos glabros y bastante cónicos. En la mitad de cada base elitral posee una cresta longitudinal saliente formada por cinco granos esféricos brillantes. Entre esta cresta y las protuberancias se encuentran varios gránulos cónicos que se alinean hasta la mitad elitral. En las partes laterales elitrales posee una serie de granos cónicos que se alinean hasta el primer cuarto apical, justo en la zona en que se extiende la franja transversa de tomento negro que va de lado a lado sin alcanzar las epipleuras. Los dos tercios apicales están en un declive muy acusado y recubiertos de grandes manchas dispersas de denso tomento dorado y pardo. Las alas posteriores presentes y bien desarrolladas.

Parte inferior del cuerpo con el prosterno corto y ancho, rebordeado y dilatado en su parte posterior que cierra las cavidades procoxales. Procoxas cónicas y muy salientes. Mesosterno corto y finamente punteado en su parte anterior, provisto de tomento dorado disperso, finamente rebordeado y hendido en su parte posterior donde se inserta el proceso del metasterno. Éste es más ancho que largo, surcado longitudinalmente, aplanado en su parte central. Metaepisternas largas y estrechas, con tomento dorado. Ventritos abdominales con el primer ventrito visible doble largo que el resto, que son levemente convexos en su parte central, que está provista de tomento dorado y tomento gris en ambos lados. Pigidio levemente más largo y sinuado en su ápice, con largas sedas doradas.

Patas largas y finas con los fémures levemente dilatados en su mitad y las tibias finas y dilatadas en su mitad apical. Las anteriores del macho levemente arqueadas. Las tibias medias poseen un profundo surco en su mitad posterior externa, precedido de un leve tubérculo. El ápice interior de cada tibia posee dos espolones apicales. Los fémures están surcados longitudinalmente en su cara inferior. Tarsos cortos y anchos, los anteriores levemente dilatados en el 2º y 3º artejo. Todos ellos con un largo tomento pardo. Oniquio poco dilatado y provisto de uñas divaricadas simples. Todas las patas provistas de tomento dorado irregularmente disperso.

Genitalia masculina (Fig. 3) con el edeago corto y arqueado, con su lámina apical inferior más larga que la superior, ápice redondeado. Endofalo largo y en forma de **U,** con leves pliegues en su zona basal con dos escleritos basales muy finos y poco visibles, zona apical con un fuerte esclerito anular. Tegmen romboidal, con los estilos aplanados y gruesos, provistos de varias largas sedas apicales y otras más cortas en ambos lados. *Spiculum gastrale* en forma de **Y**, con su ápice posterior comprimido y arqueado, VIII ventrito cónico y con sedas doradas en la zona posterior.

Diagnosis. – Esta nueva especie se separa bastante de sus congéneres por tener la forma de los élitros más alargada proporcionalmente, con la zona discal media y apical sin granulación, y levemente estriada en los machos. Las hembras (Fig. 2) presentan una mancha oblicua de tomento negro en su tercio basal. La carena lateral de gránulos lisos y brillantes es poco acusada. Las antenas en los machos son muy largas con el escapo rugoso y los artejos rojizos anillados de tomento dorado en la zona basal.

Etimología. – Esta nueva especie es nominada en honor a nuestro eminente colega Dr. Wen-Xuan Bi (Shanghái) gran especialista de los longicornios chinos y que tan extensamente ha revisado los Lamiinae correspondientes a estos géneros asiáticos y cuya colaboración ha sido fundamental para este trabajo.

Echinovelleda vietnamica **nov**. **sp**.

(Fig. 4-6)

ZooBank: https://zoobank.org/66C2565C-95B1-4E75-B305-2F3396DEF6A6

Holotipo, ♂, de 19 mm. de longitud y 7,15 mm de ancho en los hombros, procedente de Vietnam Norte, Ha Giang, V-2024, local collector (CEV).

Paratipo, 1 ♀ de 21 mm de longitud y 7,2 mm de ancho, Vietnam N. Ha Giang, V-2024 local collector (CEV).

Coloración general (Fig. 4) de los tegumentos negros con fondo dorado en la cabeza entre las bases antenales, en los lados del pronoto y entre la granulación de la base elitral, Zona discal elitral provista de un corto tomento negro en el tercio posterior entre las crestas laterales y en la zona apical. Antenas de color pardo excepto el escapo que es negro, recubiertas de un corto tomento dorado. Parte inferior del cuerpo con tomento dorado corto en el prosterno y el mesosterno. Los ventritos abdominales son negros y desnudos.

Cabeza grande y redondeada, provista de un corto cuello ancho y muy incluido en el pronoto. Surcada longitudinalmente, con las bases antenales muy salientes y bien separadas. Ojos grandes y finamente facetados, con el lóbulo inferior más largo que la mejilla. Epístoma membranoso, translucido, labro redondeado formando dos lóbulos laterales. Mandíbulas cortas y gruesas, poco arqueadas. Palpos maxilares cortos y punteados, con el ultimo artejo truncado. Antenas largas y finas, sobrepasando el ápice elitral a partir del 4º artejo, con el escapo grueso, cilíndrico, fuertemente punteado y con una cicatriz apical cerrada, pedicelo corto y punteado, 3º artejo cilíndrico, levemente más largo que el 4º y levemente ensanchado en su ápice. El resto de los artejos son muy semejantes y paulatinamente disminuyen de tamaño.

Pronoto corto y cilíndrico (ratio:91x110), levemente más ancho que largo, en su borde anterior es recto y finamente rebordeado, el posterior levemente sinuado y con un profundo surco antes del reborde. Lados levemente arqueados y provistos en su mitad de una fuerte espina cónica muy aguda. Zona discal muy rugosa, provista de una protuberancia central alargada longitudinalmente, el resto escabroso, con un leve tomento dorado irregularmente repartido. Prosterno, corto y ancho, surcado en su parte anterior, con el proceso prosternal ancho y rebordeado, cerrando las cavidades procoxales en su parte posterior. Mesosterno ancho y muy estrecho, punteado y con el proceso mesosternal ancho, rebordeado y con tomento dorado. Metasterno más ancho que largo, surcado longitudinalmente en su mitad. Metaepisternas largas y estrechas, provistas de corto tomento dorado. Ventritos abdominales finamente punteados, brillantes y con el primero visible doble largo que los restantes. Pigidio levemente más largo que ancho, recto en su borde apical. Escudete subcuadrado y con tomento dorado en ambos lados.

Élitros largos y estrechos, subparalelos (ratio: 120x69) en los machos. Lados paralelos en su mitad anterior, ensanchados a partir de la mitad posterior, acabando redondeados con un leve ángulo sutural. Sutura no rebordeada. Hombros rectos y provistos de fuertes gránulos agudos. Zona basal elitral con una cresta elevada en cada mitad de la base, esta cresta provista de 4 o 5 granos esféricos, lisos y brillantes. en la base de cada hombro se origina una larga serie de granulaciones esféricas brillantes que se extienden hasta la mitad elitral. Otra serie de granulaciones esféricas se origina en la parte lateral del hombro y se extiende por el borde elitral hasta la mitad posterior, donde se transforma en una cresta elevada y saliente, que se detiene en el cuarto apical. Zona apical oblicua, de superficie irregular pero sin granulaciones. La zona discal está provista de una corta pilosidad dorada distribuida irregularmente. El tercio posterior de los élitros provisto de una ancha banda de corto tomento negro, de distribución muy irregular, más densa y entremezclada con tomento dorado en las hembras (Fig. 5). Lados de los élitros aplanados verticalmente, con algunas granulaciones dispersas. Epipleuras anchas, pilosas y sinuosas.

Patas largas y finas, con los fémures no dilatados en su parte media. Las tibias rectas y ensanchadas en su tercio apical, con los mesotibias surcadas en su mitad. Tarsos cortos y anchos, levemente dilatados y convexos en los machos, recubiertos por cortas sedas negras. Uñas simples y divaricadas.

Genitalia masculina (Fig. 6) con el lóbulo medio corto y poco arqueado en su zona apical, con la lámina superior más corta que la inferior. Endofalo grueso y en forma de ***S***, provisto de dos escleritos basales poco visibles, endofalo medio sin escleritos aparentes, parte apical provista de un breve esclerito. Tegmen largo y estrecho, provisto de dos estilos apicales, largos finos, con algunas sedas en su zona apical. *Spiculum gastrale* en forma de **Y,** corto y arqueado. El 8ª ventrito redondeado y provisto de largas sedas apicales.

Diagnosis. Esta nueva especie es parecida a la anteriormente descrita *E.bii* **n**. **sp**., de la que se diferencia por tener la pilosidad dorada más extendida, La antenas de los machos ligeramente más cortas, con el escapo punteado, los artejos antenales negros con pilosidad dispersa. Los fémures más finos y con pilosidad parda. La espina lateral del pronoto corta y poco afilada. La cresta lateral de gránulos brillantes muy saliente a cada lado del tercio apical



Fig. **1-3**. *Echinovelleda bii* **n**. **sp**. **1**. Holotipo macho. **2**. Paratipo hembra. **3**. Genitalia masculina.



Fig. **4-6**. *Echinovelleda vietnamica* **n**. **sp**. **4**. Holotipo macho. **5**. Paratipo hembra. **6**. Genitalia masculina.

Agradecimientos

Este trabajo no habría sido posible sin la amable ayuda del Dr. Wen-Xuan BI (Shanghai) gran estudioso de este interesante género de Lamiinae, muy bien representado en los estados del sur de China (Yunnan, Guangdong, Jiangxi, Hunan). Agradecemos también a los dos revisores que han tenido a bien releer y comentarnos este trabajo.

Bibliografía

Bi W.-X., 2016. – Studies on the Flightless Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae) from China, I. Revision of the Genus *Echthistatodes* Gressitt, 1938 and its Allied Genera with Description of One New Genus, Two New Species and One New Subspecies. *Japanese Journal of Systematic Entomology*, 22 (2): 291-301.

Bi W.-X., Mu C. & Lin M.-Y., 2024. – Taxonomic studies on the genera *Echinovelleda* Breuning, 1936 and *Propedicellus* Huang, Huang & Liu, 2020 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Lamiini). *Zootaxa,* 5399(1): 65-78, 27 figs. Magnolia Press, New Zealand. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5399.1.5

Breuning S., 1936. – Novae species Cerambycidarum. V. *Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand, Riga*, 1: 274-325.

Danilevsky M., 2025. – Catalogue of Palaearctical Coleoptera. 6/1: Chrysomeloidea, I (Vesperidae, Distenidae, Cerambycidae). Edited by Mikhail Danilevsky.

Huang G.-Q., Huang J.-B. & Liu Y.-F., 2020. – Review of the genus *Hechinoschema* Thomson, 1857 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Monochamini), with description of a new genus and two new species. *Zootaxa*, 4768(4): 517-537. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4768.4.4

Pic M., 1925. – Nouveautés diverses. *Mélanges Exotico-Entomologiques*, 43 : 1-32.

Löbl I. & Smetana A., 2010. – Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 6, Chrysomeloidea. I. Löbl & A. Smetana editors, Apollo books, Stenstrup 6: 1-924.

Résumé

Vives E., 2026. – Deux nouvelles espèces du genre *Echinovelleda* Breuning, 1936 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Faunitaxys*, 14(32) : 1 – 4.

Description de deux nouvelles espèces du genre *Echinovelleda* Breuning, 1936, *E. bii* **n**. **sp**. et *E. vietnamica* **n**. **sp**., du nord du Vietnam. Le transfert du genre *Echinovelleda* Breuning à la tribu Lamiini est discuté.

Mots-clés. – Coleoptera, Cerambycidae, Lamiini, *Echinovelleda*, *bii*, *vietnamica*, nouvelle espèce, Vietnam.

Abstract

Vives E., 2026. – Two new species of the genus *Echinovelleda* Breuning, 1936 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae. *Faunitaxys*, 14(32) : 1 – 4.

Description of two new species of the genus *Echinovelleda* Breuning, 1936, *E. bii* **n**. **sp**. et *E. vietnamica* **n**. **sp**., from northern Vietnam. The transfer of the genus *Echinovelleda* Breuning to the Lamiini tribe is discussed.

Keywords. – Coleoptera, Cerambycidae, Lamiini, *Echinovelleda*, *bii*, *vietnamica*, new species, Vietnam.

Derniers articles publiés

Vives E., 2026. – Una nueva especie de *Nethinius* Fairmaire, procedente de la Isla Mauritius (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). *Faunitaxys*, 14(05) : 1 – 2. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(05)

Santos-Silva A. & Devesa S., 2026. – On *Lepturgotrichona* Gilmour, 1957 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Faunitaxys*, 14(06) : 1 – 8. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(06)

Audibert C. & Porion T., 2026. – *Scamandra sumbaensis* **n**. **sp**. : une nouvelle espèce de Fulgoridae d'Indonésie (Hemiptera : Fulgoromorpha). *Faunitaxys*, 14(07) : 1 – 2. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(07)

Sabatinelli G., Nuvoli M. T. & Cillo D., 2026. – *Polyphylla ichnusae* new species from Sardinia with notes on Mediterranean *Polyphylla* (Col. Scarabaeidae Melolonthinae Melolonthini). *Faunitaxys*, 14(08) : 1 – 16. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(08)

Davenport C., Grimaldi N. & Pequin O., 2026. – A new subspecies of *Delias patrua* Leech, 1890 (Lepidoptera: Pieridae) from East Laos. *Faunitaxys*, 14(09) : 1 – 6. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(09)

Dalens P.-H. & Robin F., 2026. – Un nouveau genre d'Agapanthiini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Faunitaxys*, 14(10) : 1 – 5. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(10)

Lourenço W. R. & Velten J., 2026. – New considerations about the outstanding variability of the genus *Chaerilobuthus* Lourenço & Beigel, 2011 (Scorpiones: Chaerilobuthidae) and the description of one more new species from Early Cretaceous Burmite. *Faunitaxys*, 14(11): 1 – 6. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(11)

Roguet J.-P., 2026. – Notes sur les Lamiinae du Panama (Coleoptera, Cerambycidae). *Faunitaxys*, 14(12) : 1 – 5. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(12)

Cerda J.-A., 2026. – Ctenuchina de Guyane française (2de partie). Les genres *Leopardellus* - *Prosopidia* - *Bipartes* - *Apoheliura* - *Passineura* & *Veraneacerea* (3e article). 20e note. *Faunitaxys*, 14(13) : 1 – 16. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(13)

Novák V., 2026. – *Bolbostetha luminaria* **sp**. **nov**. (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae: Alleculini), the first known species of the genus living in Laos. *Faunitaxys*, 14(14) : 1 – 4. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(14)

Coache A., 2026. – Première mention de la famille des Rutelinae sur l'archipel de Sao Tomé-et-Principe et description d'une nouvelle espèce d'*Adoretus* Dejean, 1833 (Coleoptera, Scarabaeidae, Rutelinae, Adoretini). *Faunitaxys*, 14(15) : 1 – 7. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(15)

Zhu Z.-H., 2026. – The genus *Acromantis* Saussure, 1870 (Mantodea: Hymenopodidae) from Laos with description of a new species based on integrated taxonomy. *Faunitaxys*, 14(16) : 1 – 11. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(16)

Herbin D., 2026. – New species of *Zanola* Walker, 1855 (Part 2) (Lepidoptera: Apatelodidae). *Faunitaxys*, 14(17) : 1 – 14. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(17)

Ythier E. & Lourenço W. R., 2026. – On the genus *Ananteris* Thorell, 1891 in French Guiana, with description of a new species (Scorpiones: Ananteridae). *Faunitaxys*, 14(18): 1 – 12. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(18)

Jiang Y.-X., Zeng F.-H., Xue H.-Y. & Ma Z.-Y., 2026. – Description of two new endogenous *Jujiroa* species (Coleoptera: Carabidae: Platyninae) from mainland China. *Faunitaxys*, 14(19): 1 – 7. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(19)

Lourenço W. R., 2026. – A synopsis of the trichobothrial patterns observed for Cretaceous amber scorpions. Part I: Buthoidea C. L. Koch, 1837 and related groups. *Faunitaxys*, 14(20): 1 – 10. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(20)

Háva J. & Zahradník P., 2026. – A new genus and species of Ptinidae (Coleoptera) from Eocene Baltic amber. *Faunitaxys*, 14(21): 1 – 4. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(21)

Sherwood D., Mukhida F., Connor R.A., Hughes G., Carter D., Curtis I., Hochart J., Gumbs K., Gumbs J.C., Buckmire Z., Morrishaw Z., Child N. & Bosquet I.V., 2026. – New data on the spiders (Arachnida: Araneae) of Anguilla, Lesser Antilles with description of seven new species. *Faunitaxys*, 14(22): 1 – 30. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(22)

Skořepa L., 2026. – New *Trichoferus* species and subspecies from Morocco (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). *Faunitaxys*, 14(23): 1 – 5. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(23)

Bubeník B, 2026. – *Jekelius* (*Jekelius*) *wrzecionkoi* **sp**. **nov**. a new species from Murcia, Spain, compared to two similar species (Coleoptera: Geotrupidae). *Faunitaxys*, 14(24) : 1 – 16. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(24)

Saitô M., 2026. – Description of a new species of *Stereopalpus* (Coleoptera, Anthicidae) related to *S. tokioensis*, from the Tôhoku region, Honshu, Japan. *Faunitaxys*, 14(25) : 1 – 3. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(25)

Lanuza-Garay A., Garcia K., Rivera M. & Audureau A., 2026. – A new species of *Hexacona* Bates, 1881 (Coleoptera: Cerambycidae: Acanthocinini) from Central America, with new geographical records from Panama and Colombia. *Faunitaxys*, 14(26) : 1 – 6. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(26)

Roguet J.-P., 2026. – Contribution à la connaissance des Acanthocinini équatoriens (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Faunitaxys*, 14(27) : 1 – 3. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(27)

Guerbas-Ababsa C., Coache A. & Delfosse E., 2026. – Taxinomie et biogéographie des phasmes (Phasmatodea) de France. Notes sur les populations sexuées méridionales de *Bacillus rossius rossius* (Rossi, 1790). *Faunitaxys*, 14(28) : 1 – 16. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(28)

Lourenço W. R. & Velten J., 2026. – Description of a new genus and species associated to the family Chaerilobuthidae Lourenço & Beigel, 2011 from Early Cretaceous Burmite (Chelicerata: Scorpiones). *Faunitaxys*, 14(29): 1 – 8. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(29)

Ythier E. & Lourenço W. R., 2026. – A new species of *Brotheas* C. L. Koch, 1838 from Brazilian Amazonia (Scorpiones: Chactidae). *Faunitaxys*, 14(30): 1 – 7. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(30)

Platia G., Mertlik J. & Dušánek V., 2026. – New species, new records, new sex descriptions and new combinations of click beetles from China (Coleoptera, Elateridae). *Faunitaxys*, 14(31): 1 – 35. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(31)

Faunitaxys est échangée avec les revues suivantes (« print versions ») :

– Annali del Museo Civico di Storia Naturale G. Doria (Italie)
– Boletín de la Asociación española de Entomología (Espagne)
– Boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología (Espagne)
– Bollettino del Museo di Storia Naturale di Venezia (Italie)
– Bulletin de la Société linnéenne de Lyon (France)
– Bulletin of Insectology (Italie)
– Heteropterus Rev. Entomol. (Espagne)
– Integrative Systematics (Allemagne)
– Israel Journal of Entomology (Israel)
– Klapalekiana (République Tchèque)
– Koleopterologische Rundschau (Allemagne)
– Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona (Italie)
– Nova Supplementa Entomologica (Allemagne)
– Proceedings of the Entomological Society of Washington (USA
– Revue suisse de Zoologie (Suisse)
– Spixiana (Allemagne)
– Zoosystematica Rossica (Russie)

Faunitaxys

Volume 14, Numéro 32, Avril 2026

SOMMAIRE

Deux nouvelles espèces du genre *Echinovelleda* Breuning, 1936 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae)
Eduard Vives . . . . . 1 – 4

CONTENTS

Two new species of the genus *Echinovelleda* Breuning, 1936 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae
Eduard Vives . . . . . 1 – 4

Illustration de la couverture :
VIETNAN N. Quàn Ba.

Crédits:

Eduard Vives : Fig. 1 & 6.
Jordi Vives : couverture.

Publié par l'Association Française de Cartographie de la Faune et de la Flore (AFCFF)